

Réponse à un article intitulé :

Excursions ornithologiques en Suisse.

On lit dans la *Revue et Magasin zoologiques*, n° 187, paraissant à Paris, un article intitulé : *Excursions ornithologiques en Suisse* :

« La Suisse, si célèbre par la variété et la beauté de ses sites, qui offrent, sur un espace restreint les aspects les plus divers, ne pouvait manquer d'attirer les étrangers qui viennent en foule chaque année pour l'admirer. Cependant, il est une classe de voyageurs qui semblent la laisser un peu de côté. C'est ainsi que les naturalistes, à l'exception des géologues et des botanistes, paraissent redouter de s'y fixer, au moins assez longtemps, pour y faire des explorations et enrichir la science de leurs observations.

« Le Valais, bien connu par la richesse de sa flore, ne peut manquer d'offrir aux ornithologistes une foule d'espèces rares et un vaste champ d'explorations intéressantes. Malheureusement, cette contrée, ajoute l'auteur de l'article, est complètement fermée pour la science. Les lois établies dans le but louable de la conservation du gibier y sont très sévères, et mal avisé serait un ornithologiste qui demanderait en temps prohibé une autorisation spéciale pour continuer ses études. Pour lui, la loi sera inexorable, et on ne lui permettra pas même, après l'ouverture de la chasse, de rechercher les petits oiseaux que l'on conserve *précieusement* dans l'intérêt de l'agriculture. »

Il est cependant incontestable que la Suisse offre, et le Valais à son exemple, une grande hospitalité à tous les hommes, et de préférence aux savants, et que les naturalistes sont bien

reçus dans tous les cantons où la science est en honneur et qu'ils reçoivent des autorités l'appui qui leur est nécessaire dans le but de poursuivre leurs recherches.

Tous les ornithologistes n'ont qu'à se féliciter de la bienveillance des autorités cantonales, qui ont toujours accordé une grande protection et une large permission à ceux qui la demandaient dans un but scientifique; mais le Valais, aussi bien que les autres cantons, ont su faire respecter les lois pour préserver les oiseaux contre le naturaliste et le braconnier ignorant et destructeur. Et quel est l'homme, quel est le naturaliste ami des fleurs et des couleurs, qui ne s'intéresserait pas à ces habitants des airs? Les plantes sont ensevelies pendant longtemps sous une couverture de neige et n'ont ainsi que quelques mois pour parcourir les phases de leur évolution annuelle. C'est le moment où nous allons les surprendre dans leur élégante toilette. Les oiseaux, par contre, ne nous quittent jamais et nous offrent une variété de couleurs qui l'emporte sur celle des plantes alpines les plus recherchées. Il est donc bien juste qu'on prenne leur défense et que la Confédération même ait établi des lois pour les préserver contre les destructeurs. Il est regrettable que l'auteur de l'article intitulé : *Excursions ornithologiques en Suisse* n'ait donné qu'un catalogue tout à fait incomplet des oiseaux qui habitent les cantons de Fribourg, Unterwald et Valais; mais on comprend facilement cette lacune, puisqu'il n'a pu séjourner que quelque temps dans ces cantons et sans permis de chasse. C'est donc dans le but de la combler que je prends la liberté de dresser le catalogue des oiseaux du Valais, dont le nombre s'élève au moins à 150, à l'exception de ceux qui ne quittent presque jamais le lac et qui, d'après M. Revon, naturaliste genevois, ne comptent pas moins de 120 espèces qui seront l'objet d'un travail postérieur, tandis que l'auteur n'en énumère que 108 en tout. Je suivrai l'ordre de classification de l'auteur et je ferai précéder d'un astérisque les noms des espèces omises.

Oiseaux du Valais.

Gypaète barbu (*Gypaetes barbatus*).

Cet oiseau se trouve encore sur les montagnes du Haut-Valais, mais il paraît devenir de jour en jour plus rare. On lit dans *Les Alpes* qu'un chasseur abattit, il y a peu de temps, et assomma à coups de crosse un Gypaète magnifique, mesurant plus de 12 pieds d'envergure. Il reçut du Gouvernement une prime de 36 francs.

Aigle royal (*Aquila fulva*).

Très commun aux environs de Fully et de Nendaz. J'ai reçu plusieurs exemplaires provenant de ces deux localités. D'après Moquin-Tandon, deux petites filles du voisinage d'Alesse (Valais), l'une âgée de cinq ans, l'autre de trois, jouaient ensemble, lorsqu'un aigle de taille médiocre se précipita sur la première, et malgré les cris de sa compagne, malgré l'arrivée de quelques paysans, l'enleva dans les airs.

Après d'actives recherches sur les rochers des environs, recherches qui n'eurent d'autre résultat que la découverte d'un soulier, d'un bas de l'enfant et de l'aire de l'aigle, au milieu de laquelle étaient seulement deux petits environnés d'un amas énorme d'ossements de chèvres et d'agneaux, un berger rencontra enfin, près de deux mois après l'événement, le cadavre de l'enfant gisant sur un rocher, à moitié nu, déchiré, meurtri et desséché. Ce rocher était à une demi-lieue de l'endroit où l'enlèvement avait eu lieu.

Circète Jean-le-Blanc (*Circætus gallicus*).

On le dit rare dans nos contrées; cependant un bel exemplaire de cette espèce, tué dans les environs de St-Maurice, m'a été apporté dernièrement,

Buse commune (*Buteo vulgaris*).

* **Bondrée apivore** (*Pernis apivorus*).

Un exemplaire de cette espèce a été tué dernièrement au Bois noir, près de St-Maurice.

Milan royal (*Milvus regalis*).

Commun dans les environs d'Evionnaz.

Milan noir (*Milvus ater*).

Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*).

Faucon cresserelle (*Tinnunculus alaudaricus*).

Autour ordinaire (*Astur palumbarius*).

Epervier ordinaire (*Accipiter nisus*).

* **Epervier majeur** (*Accipiter major*).

L'habitat du grand épervier, dit Degland, n'est pas bien déterminé. Cet oiseau n'a été rencontré jusqu'ici qu'en Suisse et en France. Cependant, malgré le doute des ornithologistes, plusieurs exemplaires provenant du Valais m'ont été remis.

Effraye commune (*Strix flammea*).

Hulotte chat-huant (*Syrnium aluco*).

Chevêche commune (*Noctua minor*).

* **Nyctale de Tengmalm** (*Nyctale Tengmalmi*).

* **Surnie chevêchette** (*Strix pygmea*).

Grand-Duc (*Bubo maximus*).

Hibou moyen Duc (*Otus vulgaris*).

Scops (*Scops Aldrovandi*).

Engoulevent (*Caprimulgus europæus*).

Martinet alpin (*Cypselus melba*).

Connu au bourg de Louèche, où il niche sur l'église. Ce qu'il y a de singulier, c'est que cet oiseau ne se trouve déjà plus à Sion, ni dans le Bas-Valais, où il est remplacé par le

Martinet noir (*Cypselus murarius*).

Hirondelle de cheminée (*Hirundo rustica*).

Hirondelle de fenêtre (*Hirundo urbica*).

Hirondelle de rocher (*Hirundo rupestris*).

Très commune le long des rochers de St-Maurice, où elle niche la plupart du temps dans des endroits inaccessibles.

Martin pêcheur (*Alcedo hispida*).

* **Guêpier** (*Merops apiaster*).

*Loriot (*Oriolus galbula*).

Corbeau ordinaire (*Corvus corax*).

» corneille (» *coronæ*).

» mantelé (» *cornix*).

* » freux (» *frugilegus*).

» choucas (» *monedula*).

*Chocard des Alpes (*Pyrrhocorax alpinus*).

Crave ordinaire (*Coracia gracula*).

Casse-noix ordinaire (*Nucifraga caryocatactes*).

Pic ordinaire (*Pica caudata*).

Coucou gris (*Cuculus canorus*).

Geai ordinaire (*Garrulus glandarius*).

Dryopée noir (*Dryopejus martius*).

Pic épeiche (*Picus major*).

» épeichette (*Piculus hortorum*).

» cendré (*Gecinus canus*).

» vert (» *viridis*).

Picoïde tridactyle (*Picoides tridactylis*).

Torcol vulgaire (*Yunx torquilla*).

Sitelle torchepot (*Sitta cæsia*).

Grimpereau (*Certhia familiaris*).

» brachydactyle (» *brachydactyla*).

Tichodrome échelette (*Tichodroma muraria*).

On l'observe souvent en hiver contre les murs du clocher de l'église de l'Abbaye de St-Maurice. Vers le mois d'avril il regagne les hauteurs.

Huppe vulgaire (*Upupa epops*).

Gobe-mouche gris (*Muscicapa griseola*).

» noir (» *atricapilla*).

» à collier (» *collaris*).

Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*).

» écorcheur (» *collurio*).

» rousse (» *rufus*).

Etourneau vulgaire (*Sturnus vulgaris*).

Moineau domestique (*Passer domesticus*).

» friquet (» *montanus*).

Bouvreuil vulgaire (*Pyrrhula vulgaris*).

* » **ponceau** (» *coccinea*).

Bec-croisé ordinaire (*Loxias curvirostra*).

Gros-bec vulgaire (*Coccothraustes vulgaris*).

* **Verdier ordinaire** (*Fringilla chloris*).

* **Pinson des Ardennes** (» *montifringilla*).

 » **ordinaire** (» *caelebs*).

Un nid très curieux de cette espèce a été trouvé dans le jardin de l'Abbaye de St-Maurice. En l'examinant avec un peu d'attention, il ne fut pas difficile de s'apercevoir que, sur un nid servant de base et fait avec soin, se trouvait un second nid fixé sur le premier, de manière qu'il n'était possible de les séparer qu'en exerçant une légère traction. Mais ce qu'il y avait de plus extraordinaire dans ce cas, c'est que les deux nids contenaient des œufs, et que ceux du premier n'avaient pas été couvés.

Niverolle des neiges (*Fringilla nivalis*).

Chardonneret élégant (*Carduelis elegans*).

Tarin ordinaire (*Fringilla spinus*).

* **Serin méridional** (*Serinus meridionalis*).

* **Venturon alpin** (*Citrinella alpina*).

* **Linotte vulgaire** (*Cannabina linota*).

Proyer d'Europe (*Emberiza miliaria*).

Bruant jaune (» *citrinella*).

 » **hortolan** (» *hortulana*).

* » **schœnicole** (» *schœniculus*).

Alouette des champs (*Alauda arvensis*).

 » **lulu** (» *arborea*).

* » **huppée** (» *cristata*).

Pipi spioncelle (*Anthus aquaticus*).

* » **des prés** (» *pratensis*).

Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*).

 » **grise** (» *alba*).

 » **boarule** (» *sulphurea*).

Rossignol ordinaire (*Philomela luscini*).

Commun le long des montagnes des environs de St-Maurice et sur les bords du Rhône.

- * Rossignol progré (*Philomela major*).
- Rouge-gorge familier (*Rubecula familiaris*).
- Rouge-queue de murailles (*Ruticilla phænicura*).
- » tithys (*Sylvia tithys*).
- * Rubiette de Caire (*Ruticilla Cairii*).
- Merle draine (*Turdus viscivorus*).
- » noir (» *merula*).
- » à plastron (» *torquatus*).
- » grive (» *musicus*).
- * » de roche (» *saxatilis*).
- * » bleu (» *cyaneus*).
- Cincle plongeur (*Cinclus meridionalis*).
- Traquet motteux (*Saxicola Œnanthe*).
- Tarier ordinaire (*Pratincola rubetra*).
- » pâtre (» *rubicola*).
- Fauvette des jardins (*Sylvia hortensis*).
- » à tête noire (» *atricapilla*).
- Bec-fin grisette (*Curruca cinerea*).
- Pouillot siffleur (*Phylloscopus sibilatrix*).
- » fitis (» *trochilus*).
- » veloce (» *rufus*).
- * Rousserole turdoïde (*Sylvia turdoides*).
- » effarvate (» *arundinacea*).
- Accenteur alpin (*Accentor alpinus*).
- » chanteur (» *modularis*).
- Troglodyte mignon (*Troglodytes parvulus*).
- Roitelet huppé (» *Regulus cristatus*).
- * » triple-bandeau (» *ignicapillus*).
- Mésange noire (*Parus ater*).
- » charbonnière (» *major*).
- » bleue (» *cæruleus*).
- * » huppée (» *cristatus*).
- Nonnette vulgaire (» *silicarius*).
- » des marais (» *alpestris*).
- Orite à longue queue (» *longicaudus*).
- Pigeon ramier (*Palumbus torquatus*).

- * Pigeon colombin (*Palumbus ænas*).
- * Tourterelle vulgaire (*Turtur auritus*).
- Tétras lyre (*Tetras tetrix*).
- » urogalle (» *urogallus*).
- Gélinotte des bois (*Bonasa sylvestris*).
- Lagopède muet (*Lagopus mutus*).
- Perdrix bartavelle (*Caccabis græca*).
- » rouge (» *rufa*).
- Caille commune (*Coturnix major*).
- * Bécasse ordinaire (*Scolopax rusticola*).
- * *Ædicnème* criard (*Ædicnemus crepitans*).
- Héron cendré (*Ardea cinerea*).
- » blongios (» *minuta*).
- * Butor étoilé (» *stellaris*).
- * Bihoreau d'Europe (*Nycticorax europæus*).
- * Pluvier doré (*Pluvialis apricarius*).
- * Vanneau suisse (*Vanellus helveticus*).
- * Pluvier gravelot (*Charadius hiaticula*).
- * Vanneau huppé (*Vanellus cristatus*).
- Bécassine ordinaire (*Gallinago major*).
- Crex des prés (*Crex pratensis*).
- Gallinule ordinaire (*Gallinula chloropus*).
- Râle d'eau (*Ralus aquaticus*).
- Canard sauvage (*Anas boschas*).
- » milouin (» *fera*).
- Foulque noire (*Fulica atra*).
- Grèbe castagneux (*Podiceps minor*).
- Plongeon lumme (*Colymbus arcticus*).

Deux beaux exemplaires ont été capturés, l'un près du Bouveret, l'autre à Trois-Torrents. Toutes les espèces et variétés mentionnées ci-dessus et celles du lac se trouvent dans le musée de l'Abbaye de St-Maurice, où on peut les voir.

Chanoine P. BESSE, professeur.